

Afdeling D2



Drains transtympaniques et/ou ablation des polypes

Toutes les informations
nécessaires sur l'opération

01 L'opération

Votre enfant sera opéré d'une oreille ou des deux oreilles en raison d'otites répétées ou d'une déficience auditive. À cette fin, des drains transtympaniques seront placés.

02 Le déroulement

Afin de rassurer au maximum votre enfant, vous pouvez l'accompagner au bloc opératoire. Pendant l'opération, vous pouvez attendre dans une salle d'attente de l'hôpital chirurgical de jour jusqu'à ce que l'opération soit terminée.

L'intervention se fait par une incision de quelques millimètres dans le tympan par laquelle l'humidité est d'abord extraite. Nous plaçons ensuite le tube dans cette incision pour que l'air puisse à nouveau entrer dans l'oreille moyenne par ce tube.

Lorsque votre enfant se réveille, vous pouvez à nouveau l'assister. Dès que votre enfant est bien réveillé et que la douleur est maîtrisée, l'infirmière du service pédiatrique viendra vous chercher.

Une fois dans la chambre, les médecins recommandent d'attendre avant de boire et de manger pour éviter les complications (comme les vomissements).

- Pendant les premiers jours, une petite quantité de liquide peut encore s'échapper de l'oreille. Si cela dure plus d'une semaine ou si le liquide est du pus ou ça sent mauvais, veuillez nous contacter ou contacter votre médecin de famille.
- Il est préférable de ne pas maintenir la tête de votre enfant sous l'eau, cela peut provoquer une infection ou un écoulement d'oreille.
- Il est autorisé de prendre une douche ou de laver rapidement les cheveux.
- Il est recommandé de ne pas nager dans les trois premières semaines suivant l'opération.
- Les tubes sont spontanément rejetés à la longue; c'est totalement indolore et le tube est si petit qu'on ne le trouve généralement pas.
- Lorsque vous rentrez à la maison, votre enfant peut boire. Il est préférable de commencer avec une petite quantité et quelque chose de léger: une bouteille de boisson sans bulles comme de l'eau ou du jus de pomme. Si tout se passe bien, votre enfant peut manger quelque chose de facilement digestible. Ensuite, vous pouvez manger normalement. Il est préférable que votre enfant ne mange pas de plats chauds pendant les premiers jours.

04 Le suivi

Généralement, la végétation (polypes) est enlevée en même temps. Cela donne rarement lieu à des douleurs. Les hémorragies sont également rares, mais nous vous recommandons de garder votre enfant au calme pendant les premiers jours. Contactez la pédiatrie ou le service des urgences en cas d'hémorragie.

Un examen de contrôle lors de la consultation est prévu. Si vous n'avez pas encore de rendez-vous, veuillez en prendre un au 011 69 95 22.

05

Le traitement de la douleur

En cas de douleur, vous pouvez donner à votre enfant un antidouleur si nécessaire, à renouveler au maximum toutes les 6 heures. Cela signifie que le Perdolan ou le Dafalgan alternent avec le Perdophen ou le Nurofen.

L'aspirine (aspegic, aspro) ou les antidouleurs contenant de l'aspirine sont interdits car ils peuvent provoquer des saignements.



Contactez en premier lieu votre médecin de famille. Si votre médecin traitant vous renvoie ou n'est pas disponible, vous pouvez contacter notre:

service des urgences
tel.: 011 69 93 33

unité de soins D2
tel.: 011 69 97 90

consultation à domicile
tel.: 011 69 95 22



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Suivez-nous sur   