

Afdeling D2



Plaatsen van trommel- vliesbuisjes Verwijderen van poliepen

Alles wat je moet weten
over de ingreep

01 De ingreep

Je kind zal een ingreep ondergaan aan één of beide oren omwille van herhaalde oorontstekingen of omwille van verminderd gehoor. Hiervoor worden trommelvliesbuisjes geplaatst.

02 Het verloop

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het heelkundig dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is.

De ingreep gebeurt via een insnijding van enkele millimeters in het trommelvlies waarlangs eerst het vocht wordt afgezogen. Aansluitend plaatsen we in deze insnijding het busje zodat er via dit busje opnieuw lucht in het middenoor kan.

Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinderafdeling jullie halen.

Eens op de kamer raden de artsen aan om nog te wachten met drinken en eten om complicaties (zoals braken) te voorkomen.

- Gedurende de eerste dagen kan er nog wat vocht uit het oor lopen. Indien dit langer dan 1 week duurt of indien het vocht etterig is of slecht ruikt, neem je met ons of met je huisarts contact op.
- Je kind kan het hoofd best niet onder water houden, dit kan infectie of oorloop veroorzaken.
- Douchen of kort de haren wassen is toegestaan.
- Je vermijdt best om te zwemmen in de eerste drie weken na de ingreep.
- De buisjes worden op langere termijn spontaan afgestoten; dit is pijnloos en het buisje is zo klein dat je het meestal niet vindt.
- Bij thuiskomst mag je kind wat drinken. Het beste is om te starten met een kleine hoeveelheid en iets licht: een flesje drank zonder bruis zoals water of appelsap. Als dit probleemloos gaat, mag je kind iets licht verteerbaar eten. Nadien mag normaal gegeten worden. De eerste dagen eet je kind best geen warme gerechten.

Meestal worden de vegetaties (poliepen) tegelijkertijd verwijderd. Dit geeft zelden aanleiding tot pijn. Nabloedingen zijn eveneens zeldzaam, toch raden we aan om je kind de eerste dagen wat rustig te houden. Neem contact op met de kinderafdeling of spoedgevallen in geval van een nabloeding.

Een controleonderzoek op de raadpleging wordt gepland. Als je nog geen afspraak hebt, gelieve één te maken op het nummer 011 69 95 22.

Bij pijn mag je je kind indien nodig een pijnstiller geven, maximaal elke 6 uur te herhalen. Dit wil zeggen Perdolan of Dafalgan afgewisseld met Perdophen of Nurofen.

Aspirine (aspegic, aspro) of aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden aangezien deze nabloedingen kunnen veroorzaken.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

dienst spoedgevallen
tel.: 011 69 93 33

afdeling D2
tel.: 011 69 97 90

thuisconsultatie
tel.: 011 69 95 22



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   