

Afdeling D2



Kalinox

Tout ce que vous devez savoir
concernant le traitement

01 Le traitement

Le Kalinox est un gaz qui se compose d'oxygène et d'azote. Elle permet aux enfants de se sentir plus calmes et moins susceptibles de ressentir de la douleur.

Le but de Kalinox

Des procédures ou des examens courts, douloureux ou désagréables, tels que les ponctions intraveineuses, les prises de sang ou les ponctions lombaires, peuvent provoquer de l'anxiété chez votre enfant et le rendre moins à l'aise. L'objectif de Kalinox est de réduire la douleur et l'anxiété.

Kalinox est administré **sur ordonnance médicale** aux enfants **à partir de quatre ans**. Sur avis médical, il peut également être utilisé chez les enfants à partir de deux ans.

Ce traitement n'est effectué qu'avec le consentement des parents.

La présence des parents

Les parents peuvent être présents pendant ce traitement pour rassurer leur enfant et le distraire.

L'enfant reste conscient afin que la communication soit possible.

En cas de grossesse, nous vous déconseillons d'entrer dans la chambre.

Votre enfant ne doit pas être à jeun pour le traitement.

L'infirmière et/ou le pédiatre se chargeront du traitement. Votre enfant respire Kalinox à travers un masque avec un ballon pendant trois minutes. Après cela, le gaz est suffisamment absorbé et nous commençons l'examen.

L'administration de Kalinox se poursuivra.

Nous plaçons un capteur sur l'orteil ou le doigt de votre enfant pour surveiller son rythme cardiaque et son taux d'oxygène dans le sang.

Pendant le traitement, votre enfant peut regarder des vidéos.

Lorsque le traitement est terminé, nous retirons le masque et le capteur. Les effets du gaz disparaissent au bout de quelques minutes. Il est préférable de soutenir votre enfant après l'intervention afin qu'il ne tombe pas. Dès que les effets ont disparu, votre enfant peut reprendre ses activités quotidiennes normales.



Photo: masque et ballon utilisés pour administrer le Kalinox

03

Quand ne faut-il pas utiliser Kalinox?

- Nous ne recommandons pas l'utilisation de Kalinox chez les enfants très anxieux et peu coopératifs ou si l'examen dure plus de 50 minutes. Dans ces cas, l'effet positif est perdu.
- Chez les enfants ayant subi un traumatisme facial ou un neurotraumatisme avec des troubles de la conscience.
- En cas d'accumulation de gaz ou de liquide dans les cavités corporelles.
- Lors de l'utilisation d'opiacés ou de produits psychopharmaceutiques.

04

Effets secondaires

Votre enfant peut se comporter différemment lorsqu'il inhale Kalinox: être joyeux, rire, paraître "ivre", somnolent ou endormi, ...

Les effets secondaires désagréables sont rares, mais il existe parfois la possibilité de nausées, de maux de tête, de vertiges et d'essoufflement.

Les effets secondaires disparaissent généralement très vite après l'arrêt de l'administration.



Contactez en premier lieu votre médecin de famille. Si votre médecin traitant vous renvoie ou n'est pas disponible, vous pouvez contacter notre:

service des urgences
tel.: 011 69 93 33

unité de soins D2
tel.: 011 69 97 90

consultation à domicile
tel.: 011 69 95 22



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Suivez-nous sur   