

Afdeling D2



Kalinox

Alles wat je moet weten
over de behandeling

Kalinox is een gas dat bestaat uit zuurstof en stikstof. Het zorgt ervoor dat kinderen zich rustiger voelen en minder pijn ervaren.

Het doel van Kalinox

Bij korte, pijnlijke of onaangename ingrepen of onderzoeken zoals een infuus prikken, een bloedafname of een lumbale punctie kan je kind angsten ervaren en is het minder aangenaam. Het doel van Kalinox is om pijn en angst te verminderen.

Kalinox gebeurt **op medisch voorschrift** bij kinderen **vanaf vier jaar**. Op doktersadvies kan dit ook bij kinderen vanaf twee jaar.

Deze behandeling wordt enkel uitgevoerd met toestemming van de ouders.

De aanwezigheid van ouders

Ouders mogen aanwezig zijn tijdens deze behandeling om je kind gerust te stellen en het af te leiden.

Het kind blijft bij bewustzijn waardoor communicatie mogelijk is.

In geval van zwangerschap raden wij af om de ruimte te betreden.

02 Het verloop

Voor de behandeling moet je kind niet nuchter te zijn.

De verpleegkundige en/ of pediater voert de behandeling uit. Je kind ademt via een masker met een ballon gedurende drie minuten Kalinox in. Hierna is het gas voldoende ingewerkt en starten we het onderzoek. De toediening van Kalinox blijft verdergezet.

We plaatsen een sensor op de teen of de vinger van je kind om de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed te controleren.

Tijdens de behandeling kan je kind filmpjes bekijken.

Wanneer de behandeling afgelopen is, nemen we het masker en de sensor weg. De effecten van het gas verdwijnen na enkele minuten.

Ondersteun je kind best na de procedure zodat het niet valt.

Zodra de effecten verdwenen zijn, mag je kind de dagdagelijkse activiteiten hervatten.



Foto: masker en ballon waarmee Kalinox wordt toegediend

- We raden het gebruik van Kalinox af bij zeer angstige, niet-meewerkende kinderen of wanneer het onderzoek langer dan 50 minuten duurt. In deze gevallen gaat de positieve werking verloren.
- Bij kinderen met een aangezichtstrauma of een neurotrauma met bewustzijnsstoornissen.
- Bij gas- of vochtophoppingen in lichaamsholten.
- Bij gebruik van opiaten of psychofarmaca.

04

Mogelijke bijwerkingen

Je kind kan zich tijdens het inademen van Kalinox anders gaan gedragen: vrolijk zijn, lachen, 'dronken' lijken, suf of slaperig zijn, ...

Onaangename bijwerkingen komen zelden voor, maar soms is er de mogelijkheid tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en benauwdheid.

De bijwerkingen verdwijnen meestal heel kort na het stoppen van de toediening.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

dienst spoedgevallen
tel.: 011 69 93 33

afdeling D2
tel.: 011 69 97 90

thuisconsultatie
tel.: 011 69 95 22



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   