

Urologie



# Blaasspoeling met Mytomicine-C

Informatiebrochure

Mitomycine-C is een antibioticum dat als bijkomende behandeling kan gebruikt worden na een TurB (zie infobrochure).

Uit onderzoek is gebleken dat na een transurethrale resectie van een blaaspoliep, deze in ongeveer 60 tot 70 % van de gevallen binnen het jaar terugkomt.

Een preventieve behandeling met Mitomycine-C is dus aan te raden, enerzijds om het risico op nieuwe blaastumoren te beperken en anderzijds om zelfs kleine tumoren te doen verdwijnen.

Een blaasspoeling met Mitomycine-C is een vorm van chemotherapie.

Het product wordt rechtstreeks via de sonde in de blaas gebracht gedurende één uur.

Hierdoor is:

- de kans op een goed resultaat het grootst;
- de kans op bijwerkingen van de chemotherapie kleiner.

Het aantal spoelingen wordt per patiënt bekeken.

## 02

### Vorbereiding van het onderzoek

De ochtend voor de blaasspoeling drink je best niet te veel, eventuele plaspillen kan je best na de spoeling innemen. Het is belangrijk dat er tijdens het spoelen zo weinig mogelijk urine in de blaas komt, omdat de Mitomycine-C anders te veel verdund wordt en daardoor een goede inwerking op de blaaswand vermindert.

Indien men klachten heeft die op een urineweginfectie kunnen duiden of bij bloed in de urine is het best om de spoeling uit te stellen tot dit nagezien en eventueel behandeld is.

Mitomycine-spoelingen worden ook niet toegediend als je zwanger bent en/of als je borstvoeding geeft.

## 03

### Na de behandeling

De spoelvloeistof dient één uur in de blaas te worden gehouden. In de urine zijn nog tot 48 uur na de spoeling resten van cytostatica aanwezig.

Elk contact van urine met de huid en zeker de ogen moet vermeden worden wegens risico op irritatie. In het ziekenhuis zal men hiervoor een aantal maatregelen treffen, zoals het werken met handschoenen. Na het verwijderen van de blaassonde kan je gewoon op het toilet gaan plassen.

## 04 Tips

- Mannen moeten altijd zittend plassen.
- Na het plassen tweemaal het toilet doorspoelen, met de wc-deksel naar beneden.
- Bij morsen de WC huishoudelijk schoonmaken.
- Nadien moeten de geslachtsdelen en de handen zorgvuldig gereinigd worden met veel water.
- Gebruik de eerste week een condoom bij seksuele betrekkingen.
- Vrouwen van vruchtbare leeftijd moeten de ganse behandeling door een voorbehoedsmiddel gebruiken.
- Bij bevuling van kleding en beddengoed: kleding en/of beddengoed in de wasmachine doen en spoelen op een koud programma. Daarna kan men een gewoon wasprogramma draaien. Op deze manier hoef je geen extra maatregelen treffen voor jezelf en de rest van de familie.

De bijwerkingen die je kan krijgen zijn:

- bloed in de urine;
- pijnlijke, branderige plasdrang;
- moeilijk plassen, pijn in de onderbuik;
- allergische huidreacties.

Deze klachten verdwijnen meestal spontaan. Indien deze klachten niet verbeteren, neem dan contact op met je huisarts of uroloog.



## Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

dienst urologie  
tel.: 011 69 95 12



**Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden**

[www.sint-trudo.be](http://www.sint-trudo.be)

Volg ons op   