

Afdeling D2




# Extractions des dents

**Chirurgie maxillo-faciale**  
Tout ce que vous devez savoir  
après l'intervention

- Pour que votre enfant soit le plus tranquille possible, vous pouvez l'accompagner au bloc opératoire. Pendant l'opération, vous pouvez attendre dans une salle d'attente de l'hôpital chirurgical de jour jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Lorsque votre enfant se réveille, vous pouvez l'assister à nouveau. Dès que votre enfant est réveillé et que la douleur est maîtrisée, l'infirmière du service pédiatrique vient vous chercher.
- Une fois de retour au service pédiatrique, votre enfant peut boire de l'eau dès qu'il est suffisamment éveillé
- Les sacs de glace dans le bandage doivent être changés régulièrement (plus il fait froid, mieux c'est). Les sacs de glace contribuent à réduire les gonflements et la douleur.

- Votre enfant peut commencer à boire, de préférence de l'eau glacée (éventuellement avec des glaçons). **Pas de boissons chaudes.** Cela provoquera un saignement des blessures. Si votre enfant a faim, vous pouvez lui donner des aliments tendres et froids, par exemple des glaces, du yaourt, du pudding, ...
- **Ne rincez pas la bouche aujourd'hui:** les caillots de sang formés seront éliminés par lavage, ce qui provoquera des saignements.
- Si nécessaire, vous pouvez donner à votre enfant des antidouleurs, par exemple du Dafalgan, de l'Ibuprofène, ... Les jeunes enfants peuvent (en fonction de leur poids) prendre du Perdophen/Nurofen ou Perdolan/Dafalgan. De préférence des suppositoires. **Ne donnez pas des antidouleurs contenant de l'aspirine:** cela peut provoquer des hémorragies secondaires.



Une hémorragie peut se produire dans les 12 à 24 premières heures. Nous recommandons les mesures suivantes:

- Pliez une compresse et appliquez-la à l'endroit du saignement.
- Mordez bien pendant au moins 10 à 30 minutes de préférence
- Si nécessaire, répétez plusieurs fois cette mesure jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
- Si le saignement ne s'arrête pas ou s'aggrave, nous vous conseillons de contacter l'hôpital (01 1 69 91 01) ou le service des urgences (01 1 69 93 33).

## 03

### Premier jour après l'opération

- Votre enfant peut manger des choses tendres (chaudes et froides), comme des sandwiches, de la soupe, de la purée, de la viande hachée ou tendre, du poisson, de la compote de pommes, ...
- Vous pouvez également donner un antidouleur supplémentaire si nécessaire.
- Il n'est plus nécessaire d'appliquer de la glace.

## 04

### Jours suivants après l'opération

- Votre enfant peut manger et boire à sa guise.
- Il est important de se rincer la bouche avec de l'eau après chaque repas !



Contactez en premier lieu votre médecin de famille. Si votre médecin traitant vous renvoie ou n'est pas disponible, vous pouvez contacter notre:

unité de soins D2  
tel.: 011 69 97 90



**Diestersteeweg 100 • 3800 Sint-Truiden**

[www.sint-trudo.be](http://www.sint-trudo.be)

Suivez-nous sur   