

Afdeling D2



Extractions des dents de sagesse

Chirurgie maxillo-faciale
Tout ce que vous devez savoir
après l'opération

Pour rassurer au maximum votre enfant, vous pouvez l'accompagner au bloc opératoire. Pendant l'opération, vous pouvez attendre dans une salle d'attente que l'opération soit terminée. Lorsque votre enfant se réveille, vous pouvez l'assister à nouveau. Dès que votre enfant est bien réveillé et que la douleur est maîtrisée, l'infirmière de la pédiatrie viendra vous chercher.

Une fois de retour à l'unité de soins, votre enfant peut boire de l'eau dès qu'il est suffisamment réveillé.

Les sacs de glace dans le bandage doivent être remplacés régulièrement (plus il fait froid, mieux c'est). Les sacs de glace aident bien contre le gonflement et la douleur.

- Votre enfant peut commencer à boire, de préférence de l'eau glacée (éventuellement avec des glaçons). **Pas de boissons chaudes.** Cela provoquera un saignement des blessures.
- Si votre enfant a faim, il peut commencer à manger **des aliments tendres et froids**, par exemple des glaces, des yaourts, des puddings, ...
- **Ne rincez pas la bouche aujourd'hui:** les caillots de sang formés seront évacués, provoquant un saignement.
- Si nécessaire, vous pouvez donner à votre enfant un antidouleur (de préférence pendant les repas et avant le coucher): par exemple l'ibuprofène 600 EG. Ne donnez pas d'antidouleurs contenant de l'aspirine: cela peut provoquer des hémorragies.
- Une hémorragie peut se produire pendant les 12 à 24 premières heures. Nous recommandons les mesures suivantes:
 - Pliez une compresse et appliquez-la sur le lieu de l'hémorragie.
 - Mordez bien fort pendant au moins 10 à 30 minutes.
 - Si nécessaire, répétez plusieurs fois le traitement jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
 - Si le saignement ne s'arrête pas ou s'aggrave, nous vous conseillons de contacter l'hôpital (011 69 91 01) ou le service des urgences (011 69 93 33).

- Votre enfant peut manger des choses tendres (chaudes et froides) comme des sandwiches, de la soupe, de la purée, de la viande hachée ou tendre, du poisson, de la compote de pommes, ...
- Il est important que votre enfant se rince la bouche avec du Perio-Aid (Corsodyl) après chaque repas. Si vous n'en avez pas en stock à la maison, vous pouvez vous procurer une bouteille à l'unité de soins. Il est important que votre enfant continue à rincer jusqu'à une semaine après que les sutures aient été retirés. Si nécessaire, vous pouvez seulement vous brosser les dents de devant.
- Si le médecin a prescrit un antibiotique à l'avance, vous commencez à le prendre le lendemain de l'opération conformément aux instructions figurant sur l'ordonnance.
- Les antidouleurs suivants sont autorisés: Ibuprofène 600 EG jusqu'à quatre fois par jour. Nous recommandons de le faire pendant au moins deux ou trois jours et de manger un petit quelque chose à chaque fois.
- Il n'est plus nécessaire d'appliquer de la glace.

04

Jours suivants après l'opération

- Votre enfant peut manger et boire à sa guise.
- Important: rincez avec Perio-Aid (Corsodyl) après chaque repas.
- Les points de suture se dissolvent en 2 à 3 semaines et il n'est pas nécessaire de les enlever.



Contactez en premier lieu votre médecin de famille. Si votre médecin traitant vous renvoie ou n'est pas disponible, vous pouvez contacter notre:

unité de soins D2
tel.: 011 69 97 90



Diestersteeweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Suivez-nous sur   