

Afdeling D2



Plombages dentaires

Chirurgie maxillo-faciale
Tout ce que vous devez savoir
après l'intervention

Pour rassurer au maximum votre enfant, vous pouvez l'accompagner au bloc opératoire. Pendant l'opération, vous pouvez attendre dans une salle d'attente que l'opération soit terminée. Lorsque votre enfant se réveille, vous pouvez l'assister à nouveau. Dès que votre enfant est bien réveillé et que la douleur est maîtrisée, l'infirmière du service pédiatrique viendra vous chercher.

Une fois de retour à l'unité de soins pédiatrique, votre enfant restera à jeun (il ne mangera ni ne boira) jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Ceci est fait pour éviter les complications.

- Votre enfant peut commencer à boire : de préférence de l'eau glacée (éventuellement avec des glaçons). **Pas de boissons chaudes.** Cela provoquera un saignement des plaies.
- Dès que les plombages sont durs (le soir), votre enfant peut commencer à manger des aliments tendres, tels qu'un sandwich, une soupe, un pudding, un yaourt, ...
Attention: les plombages ne sont durs qu'après 24 heures !
- Si nécessaire, vous pouvez donner à votre enfant des antidouleurs, par exemple du Dafalgan, de l'Ibuprofène, ...
Les jeunes enfants peuvent prendre du Perdophen/ Nurofen ou du Perdolan/ Dafalgan (en fonction de leur poids).
De préférence sous forme de suppo.
- **Ne donnez pas des antidouleurs contenant de l'aspirine:** cela peut provoquer des saignements.
- Les antibiotiques et les bains de bouche ne sont pas nécessaires.

03

Visite de contrôle

- Une visite de contrôle chez dr. De Coster n'est généralement pas nécessaire.
- En cas de problème, vous pouvez toujours vous rendre chez votre propre dentiste.



Contactez en premier lieu votre médecin de famille. Si votre médecin traitant vous renvoie ou n'est pas disponible, vous pouvez contacter notre:

unité de soins D2
tel.: 011 69 97 90



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Suivez-nous sur   