

Afdeling D2



Tandvullingen

Maxillofaciale chirurgie
Alles wat je moet weten
na de ingreep

01

Op de kinderafdeling

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal wachten tot de operatie afgelopen is. Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinderafdeling jullie halen.

Eens terug op de kinderafdeling blijft je kind nuchter (niet eten of drinken) tot na het ontslag. Dat wordt gedaan om complicaties te vermijden.

- Je kind mag iets drinken: liefst ijskoud water (eventueel met ijsblokjes erin). **Géén warme dranken.** Dit geeft aanleiding tot bloeden van de wondjes.
- Zodra de vullingen hard zijn ('s avonds), mag je kind malse voeding eten zoals een boterham, soep, pudding, yoghurt, ...
Opgelet: de vullingen zijn pas 'steenhard' na 24 uur!
- Indien nodig mag je je kind pijnstilling geven (vb. Dafalgan, Ibuprofen, ...)
Jonge kinderen kunnen (volgens hun gewicht) vb. Perdophen/ Nurofen of Perdolan/ Dafalgan nemen. Dit liefst in suppvorm.
- **Geef geen aspirinehoudende pijnstillers:** dit kan nabloedingen veroorzaken.
- Antibiotica en mondspoeling zijn niet nodig.

03

Controleraadpleging

- Een controleraadpleging bij dr. De Coster is meestal niet nodig.
- Bij problemen kan je steeds terecht bij je eigen tandarts.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

afdeling D2
tel.: 011 69 97 90



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   