




Hoe de dosis- aërosol zonder voorzetkamer correct gebruiken?

01


Hoe de dosisaërosol zonder voorzetskamer® correct gebruiken?

Gebruiksklaar maken



- Neem het dopje van het mondstuk.
- Schud de dosisaërosol krachtig gedurende enkele seconden.
- Houd de inhalator rechtop met de opening naar beneden.

Inhaleren



- Neem een rechthoudende houding aan.
- Adem rustig en volledig uit (**nooit uitademen in de inhalator**).



- Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- Buig het hoofd licht achterover.
- Begin langzaam en diep in te ademen en druk op hetzelfde moment de dosisaërosol in. Blijf daarna verder inademen.
- Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
- Adem rustig uit langs de mond.
- Indien je meerdere dosissen moet nemen: herhaal vorige stappen.
- Plaats het dopje terug op het mondstuk.
- Spoel de mond met water (niet inslikken).

02 Tips

- Bij het eerste gebruik van de dosisaërosol: verstuif twee dosissen in de lucht.
- Bij gebruik van corticosteroiden (Flixotide[®], Pulmicort[®], Seretide[®]): de mond tweemaal met water spoelen.
- Bewaar de dosisaërosol op een droge en koele plaats
- De dosisaërosol is leeg indien er zichtbaar niets meer vrijkomt.

| | |
|------------|------------|
| Atrovent® | Pulmicort® |
| Combivent® | Serevent® |
| Duovent® | Seretide® |
| Flixotide® | Ventolin® |

Op basis van de aanbevelingen van de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen.

Website: www.bvpv-sbip.be



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

afdeling G2
tel.: 011 69 97 30

dienst pneumologie
tel.: 011 69 96 15



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   