

Orthopedie



Fraxiparine


Alles wat je moet weten over
toediening Fraxiparine

01

Vorbereiding

Was je handen met water en zeep. Droog ze met een handdoek.

Zit of lig in een comfortabele positie. De prik gebeurt op de zijkant van de onderbuik, 5 cm van de navel. Wissel de linker- en rechterkant af bij elke prik.



Verwijder de dop die de naald beschermt. Gooi deze weg.

Opgelet: raak de naald niet aan en vermijd dat deze in contact komt met een ander oppervlak voor de prik.


02 De injectie

De aanwezigheid van een kleine luchtbel in de spuit is normaal. Deze luchtbel mag niet verwijderd worden vóór de prik. Zorg dat de luchtbel zich tegen de stamper bevindt (eventueel door te tikken tegen de spuit).

Knijp voorzichtig de huid samen om zo een huidplooi te vormen. Hou de huidplooi aan tussen duim en wijsvinger tijdens het prikken.



Hou de spuit stevig vast tussen de vingers. Breng de naald in haar volledige lengte loodrecht (met een hoek van 90°) in de huidplooi in.



Spuit de inhoud in door de stamper volledig in te duwen. Verwijder de naald uit de huid. Op de plaats van de prik mag niet gewreven worden.

03 Nazorg

Plaats de beschermhuls na inspuiting rond de naald om prikaccidenten te vermijden. Hou de spuit met één hand bij de huls vast en trek met de andere hand stevig aan de vingersteun om de huls te ontgrendelen. Schuif de huls naar voren tot je een klik hoort.



Gooi de gebruikte spuit weg zoals jouw arts of verpleegkundige je dat heeft uitgelegd.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

afdeling F1
tel.: 011 69 98 00

secretariaat orthopedie
tel.: 011 33 42 86

secretariaat dr. Bollars
tel.: 011 69 96 60



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   