

Gastro-enterologie



# Gastroscoopie

Alles wat je moet weten  
over het onderzoek

# 01

## Wat is een gastroscopie?

Bij een gastroscopie worden de slokdarm, de maag en het duodenum (twaalfvingerige darm) onderzocht.

Dit gebeurt door middel van een soepele tube met een diameter van 9 mm en een camera aan het uiteinde.

Het onderzoek geeft een kleurenbeeld van de binnenzijde van de slokdarm, de maag en het duodenum.

Dit onderzoek wordt meestal gebruikt om de reden te achterhalen van slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, brandend maagzuur, bloeding, indigestie, buikpijn of pijn op de borst.

Doorheen de gastroscopie kunnen andere instrumenten ingebracht worden. Daardoor kunnen ook kleine behandelingen onmiddellijk uitgevoerd worden, zoals afnemen van weefselstalen (voor later onderzoek onder de microscoop), stelpen van bloedingen, wegnemen van poliepen, openmaken van vernauwingen, ...

## 02

### Vorbereiding van het onderzoek

Vanaf 6 uur voor het onderzoek mag je **niet eten of drinken**, omdat resten het zicht ernstig kunnen belemmeren.

Sommige **hart- of longziekten** kunnen bepaalde voorzorgen vereisen. Breng jouw arts hiervan op de hoogte vooraleer het onderzoek begint.

Vermeld ook aan de arts **alle medicatie** die je neemt, vooral bloedverdunners, koortswerende middelen, pijnstillers, ...

## 03

### Verloop van het onderzoek

- Draag losse kledij.
- Kom tijdig naar het ziekenhuis (volgens jouw afspraak).
- Schrijf je in via de kiosk. Deze zal je doorverwijzen naar een inschrijvingsloket waar jouw inschrijving verder verwerkt wordt.
- Ga vervolgens naar functiemetingen - endoscopie (**blok D, verdieping 1**).
- Bij het begin van het onderzoek wordt de achterzijde van de mond en de keel met een spray lokaal verdoofd om de braak-reflex te onderdrukken. Bij erg angstige patiënten is het mogelijk om ook een verdovend middel via de ader in te spuiten zodat het

onderzoek comfortabeler kan verlopen voor de patiënt.

- Het onderzoek duurt 5 minuten.
- Nadien mag je het ziekenhuis verlaten. Tenzij je een verdovend middel hebt ingespoten gekregen.
- De resultaten van dit onderzoek verneem je via de huisarts.

## **04** Nazorg

- Omwille van de lokale verdoving van mond en keel, mag je niet eten of drinken tot deze verdoving is uitgewerkt. Dit wegens het gevaar op verslikken. Na ongeveer 30 minuten is de verdoving uitgewerkt.
- Jouw keel kan de dag van het onderzoek licht geïrriteerd aanvoelen.
- Omdat er lucht ingeblazen en vocht afgezogen wordt, kan je de dag van het onderzoek een licht opgeblazen gevoel in de buik hebben.

- Indien je een verdovend middel gekregen hebt, moet je in het dagziekenhuis/ functiemetingen - endoscopie blijven tot dit middel grotendeels is uitgewerkt (1 à 2 uur). In dat geval mag je gedurende de eerstvolgende 24 uur geen auto besturen of andere potentieel gevaarlijke activiteiten verrichten (zoals dakwerken uitvoeren, computer programmeren, contracten afsluiten ...).

## **05** Risico's

Een gastroscopie is een zeer veilig onderzoek. In zeldzame gevallen kan het toegediende verdovende middel een abnormale reactie veroorzaken, doch de risico's zijn gekend. Elk endoscopisch centrum is uitgerust met de nodige middelen om deze onverwachte reactie te behandelen. Behandelingen tijdens een gastroscopisch onderzoek houden een iets groter risico in, maar ook deze zijn erg beperkt.



## Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

secretariaat gastro-enterologie en endoscopie:

tel.: 011 69 96 00



**Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden**

[www.sint-trudo.be](http://www.sint-trudo.be)

Volg ons op   