

## Cisplatin – Etoposide - Endoxan

### Toediening

De therapie bestaat uit drie verschillende celremmende geneesmiddelen (cytostatica): Cisplatin, Etoposide en Endoxan.

Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Dag 1 tot en met Dag 4 : toediening van Cisplatin : inloopsnelheid 1 uur. Vervolgens toediening van Etoposide over 30 minuten. Op dag 4 wordt hier tevens Endoxan aan toegevoegd.

Naam chemo	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5 - 28	Duur van toediening
Cisplatin	√	√	√	√	/	1 uur
Etoposide	√	√	√	√	/	1 uur
Endoxan	/	/	/	√	/	30 min

### Mogelijke nevenwerkingen

- Verminderde beenmergreserve: daling van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit maakt je vatbaarder voor infecties, vermoeidheid en bloedingen. Koorts is een alarmsignaal. Boven de 38° wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen.
- Misselijkheid en braken. Smaak- en reukveranderingen. Mondslijmvliesontsteking (vb. aften). Diarree.
- Tintelingen / voosheid vinger- en teen toppen. Enerzijds de directe ontwikkeling van klachten enkele dagen na de chemotoediening, met name uitgelokt door koude: acute neuropathie. Anderzijds na verloop van tijd het ontstaan van een constante gevoelsverandering: chronische neuropathie.
- Verhoogd risico op blaasontsteking. De dagen na de chemotherapie is het belangrijke voldoende te drinken.
- Invloed op je nierfunctie.
- Invloed op het gehoor.
- Haarverlies is mogelijk, huiduitslag.
- Invloed op de seksualiteit en intimiteit. Gevoelens van angst, boosheid en verdriet.

### Nabehandeling

Litican tot 6 co per dag zo misselijk.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Imodium instant bij diarree, tot 8 co per dag.

Movicol tot 3 co per dag bij diarree.