

Carboplatine/5-FU +RT huisarts

Dagelijks wordt radiotherapie voorzien gedurende 7 weken met toediening van carboplatine/ 5-FU als radiosensitizer. Carboplatine/ 5-FU wordt drie-wekelijks toegediend gedurende 2-3 cycli. Carboplatine wordt één maal daags toegediend gedurende vier dagen. Hierbij wordt ook een continue infuus met 5-FU gestart (96u).

* Carboplatine /5-FU: de te verwachten nevenwerkingen zijn vermoeidheid, nausea en smaakverandering, mucositis, sensorische polyneuropathieklachten en diarree. Tevens myelumsuppressie. Bij koorts ($> 38^{\circ}$) is een dringende bloedafname vereist om de noodzaak van opstart intraveneus breed spectrum antibiotica te bekijken.

* Radiotherapie:

Tijdens de behandeling verwachten we progressief toenemende klachten van smaak- en geurverandering en anorexia, slikmoeilijkheden, heesheid, xerostomie, orofaryngeale pijn, mucositis en radiodermatitis. Deze nevenwerkingen nemen toe tot twee weken na het beëindigen van de radiotherapie, waarna verbetering te verwachten is.

Co-medicatie

Litican tot 6 co per dag zo misselijk.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Oncologische mondspoeling zo mucositis aanwezig is.