

Carboplatine /5-FU + bestraling

Toediening

De therapie bestaat uit radiotherapie (bestraling) en twee celremmende geneesmiddelen (cytostatica): carboplatine en 5-FU.

Dagelijks wordt radiotherapie voorzien gedurende 7 weken.

Chemotherapie: dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloeuitslagen en je algemene toestand dit toelaten. In totaal worden 2-3 cycli toegediend, via hospitalisatie.

Dag 1: Toediening van carboplatine 1/dag gedurende vier dagen. Opstart van continue infuus met 5-FU.

Dag 5: Afschakeling 5-FU infuus.

	Dag 1-4	Dag 5-21	Dag 22-25	Dag 26 - 42	Duur van toediening
Radiotherapie	√	√	√	√	5 dagen per week, 1 tot 2x per dag
Carboplatine	√		√		1 uur, 1x per dag – 4 dagen
5-FU	√		√		Continue infuus 96u

Mogelijke nevenwerkingen

De nevenwerkingen nemen geleidelijk aan toe, tot twee weken na het beëindigen van de radiotherapie. Hierna is verbetering te verwachten.

Radiotherapie:

- Smaak- en geurverandering, verminderde eetlust.
- Droge mond.
- Pijn thv de mond en keel met slikmoeilijkheden.
- Ontsteking van het slijmvlies thv de mond en keel.
- Roodheid en ontsteking van de huid thv de hals.
- Verhoogd risico op cariës.
- Heesheid.

Chemotherapie

- Verminderde beenmergreserve: daling van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit maakt je vatbaarder voor infecties, vermoeidheid en bloedingen. Koorts is een alarmsignaal. Boven de 38° wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen.
- Misselijkheid en braken. Smaak- en reukveranderingen. Mondslijmvliesontsteking (vb. aften).
- Tintelingen, gevoelsveranderingen thv vingers en tenen.
- Diarree.
- Vermoeidheid.
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet.

Nabehandeling

Litican tot 6 co per dag zo misselijk.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Imodium instant bij diarree, tot 8 co per dag.

Oncologische mondspoeling zo mucositis aanwezig is.