

## Cetuximab + bestraling

### Toediening

De therapie bestaat uit radiotherapie (bestraling) en één celremmend geneesmiddel (cytostaticum): cisplatine.

Dagelijks wordt radiotherapie voorzien gedurende 7 weken.

Op dag 1 wordt gestart met cetuximab via daghospitalisatie. Cetuximab wordt één keer per week toegediend, zolang de bestraling loopt. Een toediening duurt 1 uur. De eerste toediening wordt echter trager gegeven, 1 week voor start van de bestraling.

1 cyclus	Dag -7	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Duur van
Radio-therapie		√	√	√	√	√	√	√	1/dag
Cetuximab	√	√							60 min.

### Mogelijke nevenwerkingen

De nevenwerkingen nemen geleidelijk aan toe, tot twee weken na het beëindigen van de radiotherapie. Hierna is verbetering te verwachten.

#### Radiotherapie:

- Smaak- en geurverandering, verminderde eetlust.
- Droge mond.
- Pijn thv de mond en keel met slikmoeilijkheden.
- Ontsteking van het slijmvlies thv de mond en keel.
- Roodheid en ontsteking van de huid thv de hals.
- Verhoogd risico op cariës.
- Heesheid.

#### Cetuximab:

- Magnesium te kort
- Huidreacties:
  - Acné-achtige huiduitslag op het gelaat, de hoofdhuid, de hals, de borst en de rug.
  - Droge huid, kloven en eczema.
  - Ontsteking van het nagelbed.
  - Droge slijmvliezen (vaginale droogte, afters in de mond, droge, rode of pijnlijke ogen)
  - Bruinverkleuring van de huid, gesprongen haarvaatjes, veranderingen in de beharing (lange wimpers, mild haarverlies op het hoofd, trager groeiende baard ...).

### Nabehandeling

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Rozex crème 2/dag ter preventie van huidreacties.

Oncologische mondspoeling zo mucositis aanwezig is.