

## Cisplatine + bestraling

### Toediening

De therapie bestaat uit radiotherapie (bestraling) en één celremmend geneesmiddel (cytostaticum): cisplatine.

Dagelijks wordt radiotherapie voorzien gedurende 7 weken.

Op dag 1 wordt gestart met cisplatine via daghospitalisatie. Cisplatine wordt één keer per week toegediend, zolang de bestraling loopt.

1 cyclus	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Duur van toediening
Radiotherapie	√	√	√	√	√	√	√	1/dag
Cisplatine	√							60 min

### Mogelijke nevenwerkingen

De nevenwerkingen nemen geleidelijk aan toe, tot twee weken na het beëindigen van de radiotherapie. Hierna is verbetering te verwachten.

#### Radiotherapie:

- Smaak- en geurverandering, verminderde eetlust.
- Droge mond.
- Pijn thv de mond en keel met slikmoeilijkheden.
- Ontsteking van het slijmvlies thv de mond en keel.
- Roodheid en ontsteking van de huid thv de hals.
- Verhoogd risico op cariës.
- Heesheid.

#### Chemotherapie

- Verminderde beenmergreserve: daling van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit maakt je vatbaarder voor infecties, vermoeidheid en bloedingen. Koorts is een alarmsignaal. Boven de 38° wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen.
- Misselijkheid en braken. Smaak- en reukveranderingen. Mondslijmvliesontsteking (bv. aften).
- Tintelingen, gevoelsveranderingen thv vingers en tenen.
- Vermoeidheid.
- Gehoorsvermindering en oorsuizingen.
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet.

### Nabehandeling

Litican tot 6 co per dag zo misselijk.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Oncologische mondspoeling zo mucositis aanwezig is.