

Cisplatine 100mg/m²

Dagelijks wordt radiotherapie voorzien gedurende 7 weken met toediening van cisplatine als radiosensitizer. Cisplatine wordt drie-wekelijks toegediend via hospitalisatie (2 overnachtingen), gedurende 2-3 cycli. Gezien cisplatine nefrotoxisch is wordt hospitalisatie voorzien voor pre- en posthydratatie.

* Cisplatine 100mg/m²: de te verwachten nevenwerkingen zijn vermoeidheid, nausea en smaakverandering, mucositis, sensorische polyneuropathieklachten, nefro- en ototoxiciteit. Tevens myelumsuppressie. Bij koorts (> 38°) is een dringende bloedafname vereist om de noodzaak van opstart intraveneus breedspectrum antibiotica te bekijken.

* Radiotherapie:

Tijdens de behandeling verwachten we progressief toenemende klachten van smaak- en geurverandering en anorexia, slikmoeilijkheden, heesheid, xerostomie, orofaryngeale pijn, mucositis en radiodermatitis. Deze nevenwerkingen nemen toe tot twee weken na het beëindigen van de radiotherapie, waarna verbetering te verwachten is.

Co-medicatie

Litican tot 6 co per dag zo misselijk.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Oncologische mondspoeling zo mucositis aanwezig is.