

Cisplatine 100mg/m² + bestraling

Toediening

De therapie bestaat uit radiotherapie (bestraling) en één celremmend geneesmiddel (cytostaticum): cisplatine.

Dagelijks wordt radiotherapie voorzien gedurende 7 weken.

Op dag 1 wordt cisplatine toegediend via hospitalisatie. Je blijft voor 1 nacht. Dit is noodzakelijk omdat je naast de chemotherapie nog extra vocht toegediend krijgt om te voorkomen dat de therapie je nieren aantast.

Elke cyclus duurt drie weken (21 dagen). In totaal worden minstens 2 cycli toegediend. Soms duurt de therapie 7 weken (49 dagen) en krijg je 3 keer chemotherapie

	Dag 1	Dag 2-21	Dag 22	Dag 23 - 42	Duur van toediening
Radiotherapie	√	√	√	√	5 dagen per week, 1 tot 2x per dag
Cisplatine	√		√		3-4uur

Mogelijke nevenwerkingen

De nevenwerkingen nemen geleidelijk aan toe, tot twee weken na het beëindigen van de radiotherapie. Hierna is verbetering te verwachten.

Radiotherapie:

- Smaak- en geurverandering, verminderde eetlust.
- Droge mond.
- Pijn thv de mond en keel met slikmoeilijkheden.
- Ontsteking van het slijmvlies thv de mond en keel.
- Roodheid en ontsteking van de huid thv de hals.
- Verhoogd risico op cariës.
- Heesheid.

Chemotherapie

- Verminderde beenmergreserve: daling van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit maakt je vatbaarder voor infecties, vermoeidheid en bloedingen. Koorts is een alarmsignaal. Boven de 38° wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen.
- Misselijkheid en braken. Smaak- en reukveranderingen. Mondslijmvliesontsteking (bv. aften).
- Tintelingen, gevoelsveranderingen thv vingers en tenen.
- Vermoeidheid.
- Gehoorsvermindering en oorsuizingen.
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet.

Nabehandeling

Litican tot 6 co per dag zo misselijk.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Oncologische mondspoeling zo mucositis aanwezig is.