

## Cisplatin /5-FU + Cetuximab

### Toediening

#### *Cisplatinum /5-FU*

De therapie bestaat uit een twee celremmende geneesmiddelen (cytostatica): cisplatine en 5-FU.

Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 1 opname voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Dag 1: Op dag 1 krijg je cisplatine en cetuximab toegediend via een infuus. Hierna wordt een pompje met 5-FU aangehangen. Je blijft voor 1 nacht. Dit is noodzakelijk omdat je naast de chemotherapie nog extra vocht toegediend krijgt om te voorkomen dat de therapie je nieren aantast.

Dag 5: Afkoppelen van het 5-FU pompje, na 96u door een thuisverpleegkundige.

#### *Cetuximab*

Cetuximab wordt één keer per week toegediend via een infuus.

Dag 1: toediening in combinatie met cisplatine en 5-FU via hospitalisatie.

Dag 8 en 15: toediening via daghospitalisatie

Naam chemo	Dag							Duur van toediening
	1	2	3	4	5	8	15	
Cisplatine	√							Infuus over 4u
Cetuximab	√					√	√	Infuus over 1 uur
5-FU	√	√	√	√	//			Infusor over 96u

### Mogelijke nevenwerkingen

#### *Cisplatinum /5-FU*

Verminderde beenmergreserve: daling van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit maakt je vatbaarder voor infecties, vermoeidheid en bloedingen. Koorts is een alarmsignaal. Boven de 38° wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen.

Misselijkheid en braken. Smaak- en reukveranderingen. Mondslijmvliesontsteking (bv. aften).

Tintelingen, gevoelsveranderingen thv vingers en tenen.

Vermoeidheid.

Gehoorsvermindering en oorsuizingen.

Diarree.

Gevoelens van angst, boosheid en verdriet.

#### *Cetuximab*

Magnesium te kort

Huidreacties:

Acné-achtige huiduitslag op het gelaat, de hoofdhuid, de hals, de borst en de rug.

Droge huid, kloven en eczema.

Ontsteking van het nagelbed.

Droge slijmvliezen (vaginale droogte, aften in de mond, droge, rode of pijnlijke ogen)

Bruinverkleuring van de huid, gesprongen haarvaatjes, veranderingen in de beharing (lange wimpers, mild haarverlies op het hoofd, trager groeiende baard ...).

## Nabehandeling

Litican tot 6 co per dag zo misselijk.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Imodium instant bij diarree, tot 8 co per dag.

Rozex crème 2/dag ter preventie van huidreacties.