

Cisplatin /5-FU

Toediening

De therapie bestaat uit een twee celremmende geneesmiddelen (cytostatica): cisplatine en 5-FU.

Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 1 opname voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Dag 1: Op dag 1 krijg je cisplatine toegediend via een infuus. Hierna wordt een pompje met 5-FU aangehangen. Je blijft voor 1 nacht. Dit is noodzakelijk omdat je naast de chemotherapie nog extra vocht toegediend krijgt om te voorkomen dat de therapie je nieren aantast.

Dag 5: Afkoppelen van het 5-FU pompje, na 96u door een thuisverpleegkundige.

Naam chemo	Dag						Duur van toediening
	1	2	3	4	5	6-21	
Cisplatine	√						Infuus over 4u
5-FU	√	√	√	√	Afkoppelen		Infusor over 96u

Mogelijke nevenwerkingen

- Verminderde beenmergreserve: daling van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit maakt je vatbaarder voor infecties, vermoeidheid en bloedingen. Koorts is een alarmsignaal. Boven de 38° wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen.
- Misselijkheid en braken. Smaak- en reukveranderingen. Mondslijmvliesontsteking (vb. aften).
- Tintelingen, gevoelsveranderingen thv vingers en tenen.
- Vermoeidheid.
- Gehoorsvermindering en oorsuizingen.
- Diarree.
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet.

Nabehandeling

Litican tot 6 co per dag zo misselijk.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Imodium instant bij diarree, tot 8 co per dag.