

Cisplatinue/ 5-FU/ Taxotere

Cisplatinue/ 5-FU / Taxotere wordt drie-wekelijks toegediend via hospitalisatie. Op dag 1 wordt cisplatinue en Taxotere toegediend waarna een infusor met 5-FU wordt gestart. Na vijf dagen dient deze te worden afgekoppeld. Gezien cisplatinue nefrotoxisch is wordt hospitalisatie voorzien voor pre- en posthydratatie.

De te verwachten nevenwerkingen zijn vermoeidheid, nausea en smaakverandering, mucositis, sensorische polyneuropathieklachten, nefro- en ototoxiciteit, , allergische reactie, griepaal syndroom, en diarree. Tevens myelumsuppressie. Bij koorts ($> 38^{\circ}$) is een dringende bloedafname vereist om de noodzaak van opstart intraveneus breedspectrum antibiotica te bekijken.

Ter preventie van de allergische reacties wordt daags voor, de dag van en de dag na de toediening Medrol aan 2 x 32mg gegeven.

Co-medicatie

Medrol 32 mg 2/dag: de dag vóór, van en na de de chemotherapietoediening.

Litican tot 6 co per dag zo misselijk.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Imodium instant bij diarree, tot 8 co per dag.