

Verminderd aantal witte bloedcellen: toediening van neulasta

Chemotherapie onderdrukt het beenmerg waardoor het tijdelijk minder witte bloedcellen aanmaakt. Dit heet neutropenie. Een vermindering van het aantal witte bloedcellen voel je als patiënt niet, maar het vergroot de kans op een infectie.

Je arts kan beslissen om groeifactoren onder de vorm van een inspuiting toe te dienen. Deze inspuiting zorgt ervoor dat het tekort aan witte bloedcellen sneller zal herstellen. Hierdoor wordt de kans op een infectie kleiner.

Het soort inspuiting (langwerkend of kortwerkend) en het tijdstip van toediening wordt bepaald door je arts. Deze inspuiting kan zowel thuis als in het ziekenhuis worden toegediend door een verpleegkundige.

Een attest voor de thuisverpleging wordt meegegeven.

Grieperige klachten en pijn ter hoogte van bot en spieren kunnen optreden, vaak pas verschillende dagen na de inspuiting. Deze klachten houden normaal gezien niet langer aan dan 24u. Dit kan verholpen worden door het innemen van een pijnstiller onder de vorm van paracetamol (1g max 3-4x / dag).

De inspuiting wordt vanuit de afdeling meegegeven en moet koel bewaard worden.