

Bendamustine - Gazyvaro

Toediening

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (cytostaticum): Bendamustine.

Gazyvaro is een immunotherapie: een behandeling die werkt via het 'immuunsysteem' of afweersysteem. Door Gazyvaro gaat het afweersysteem de kankercellen beter aanvallen en vernietigen.

Hoe verloopt de therapie?

Eén cyclus duurt 4 weken. De toediening gebeurt op twee achtereenvolgende dagen. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.

Tijdens de eerste cyclus wordt Gazyvaro op dag 1, 8 en 15 toegediend. Vanaf de tweede cyclus enkel op dag 1.

Cyclus 1

Naam chemo	Dag 1	Dag 2	Dag 8	Dag 15	Dag 16-28
Bendamustine	√	√			Infuus over 1 uur
Gazyvaro	√	√	√	√	Infuus over ca 3 uur

Cyclus 2 - 6

Naam chemo	Dag 1	Dag 2	Dag 3-28	Duur van toediening
Bendamustine	√	√		Infuus over 1 uur
Gazyvaro	√			Infuus over ca 3 uur

Mogelijke nevenwerkingen

- Allergische reacties; het optreden van huiduitslag (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Het is belangrijk dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk te melden aan de verpleegkundige of arts.
- Verminderde beenmergreserve: daling van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit maakt je vatbaarder voor infecties, vermoeidheid en bloedingen. Koorts is een alarmsignaal. Boven de 38° wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen.
- Misselijkheid en braken. Smaak- en reukveranderingen.
- Huidveranderingen, nooit haarverlies.
- Invloed op de seksualiteit en intimiteit. Gevoelens van angst, boosheid en verdriet.

Nabehandeling

De eerste maand moet Zyloric 1/ dag ingenomen worden.

Perio-aid 2 maal per dag ter preventie mucositis.

Imodium instant bij diarree, tot 8 co per dag.

Litican tot 6 co per dag bij misselijkheid.