

Urologie



Cystografie na een radicale prostatectomie

informatiebrochure

01

Inleiding

Na het verwijderen van de prostaat ga je naar huis met een verblijfsonde. Deze blijft na de ingreep twee weken ter plaatse tot na de controle van de verbinding plasbuisblaas. Dit gebeurt aan de hand van een cystografie.

Je afspraak voor dit onderzoek krijg je op de heelkundige dienst mee bij het ontslag na de ingreep.

In deze brochure vind je informatie over het verloop van het onderzoek en de voorbereiding ervan.

02

Wat breng je mee naar het ziekenhuis?

- Identiteitskaart
- Pyjama, evt. kamerjas
- Medicatielijst
- Thuismedicatie voor 24 uur
- Gemakkelijk schoeisel
- Toiletgerief

03

Vorbereiding van het onderzoek

Het onderzoek vergt geen speciale voorbereiding, je hoeft niet nuchter te zijn.

Schrijf je in de dag van het onderzoek om 8 uur 's morgens aan het onthaal. Je zal voor het onderzoek ambulantly opgenomen worden op een verpleegafdeling, dit wil zeggen dat je de dag zelf 's avonds normaal gezien weer naar huis kan.

Wanneer je op de verpleegafdeling komt mag je comfortabele kledij aandoen (pyjama).

De verpleegkundige zal je een identificatie-armbandje aandoen.

04

Het onderzoek zelf

Er wordt een contraststof in de blaas gebracht via de verblijfssonde. Nadien wordt er aan de hand van foto's gecontroleerd of er geen lekkage is ter hoogte van de verbinding van de plasbuis en de blaas.

Indien er geen lekkage waarneembaar is in de verbinding tussen de plasbuis en de blaas wordt op advies van de arts de verblijfssonde verwijderd door de verpleegkundige op de verpleegafdeling.

Na het verwijderen van de blaassonde blijf je nog even op de verpleegafdeling ter observatie. Het blaasresidu (de hoeveelheid urine die er in de blaas is achtergebleven na het plassen) wordt gecontroleerd door de verpleegkundige aan de hand van een echografisch toestel, de bladderscan. Wanneer je goed kan wateren en het residu niet te hoog is, mag je in de late namiddag naar huis gaan.

Na het verwijderen van de sonde kunnen verschijnselen zoals bloedplassen, valse plasdrang, niet kunnen plassen, buikpijn en ongewild urineverlies optreden.

Daarom blijf je best nog even op de afdeling. Er wordt gemeten of je je helemaal leeg plast aan de hand van een bladderscan.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

secretariaat dr. Vanderkerken/
dr. Goossens
tel.: 011 69 95 12



Diestersteeweg 100 • 3800 Sint-Truiden
t 011 69 91 11 • f 011 69 91 10
info@stzh.be • www.sint-trudo.be