

Hoofd-halscentrum



Implantaten

Informatiebrochure

01

Wat is een tandimplantaat?

Een tandimplantaat is een kunstmatige tandwortel. Het is schroefvormig en wordt vervaardigd uit titanium. Het kaaksbot groeit vast aan het titanium, zodat een stevige verankering van deze kunstwortel ontstaat. Op die manier kan men volledig vastzittende tanden verkrijgen, zelfs na verlies van alle eigen tanden.

Wanneer je interesse hebt in het plaatsen van een implantaat, kom je eerst op consultatie bij één van de kaakchirurgen. Er wordt een 3D scan genomen van het gebit en de kaak, zodat we kunnen kijken of er voldoende bot aanwezig is voor het plaatsen van het implantaat.

Indien er te weinig bot aanwezig is, kan dit soms verholpen worden door een botopbouw. Tijdens de eerste consultatie krijg je ook een prijsbestek over de kosten van deze behandeling.



Wanneer de tand eerst verwijderd dient te worden vooraleer het implantaat geplaatst kan worden, zijn er twee mogelijkheden:

- De tand kan geëxtraheerd worden waarna er een genezingsperiode van ± 3 maanden wordt gehanteerd.
- Het implantaat kan in sommige gevallen onmiddellijk geplaatst worden na de extractie.

Beide opties kunnen besproken worden tijdens de eerste consultatie.

Het plaatsen van een implantaat gebeurt meestal onder lokale verdoving.

Nadat de dokter de verdoving toebrengt, wordt een klein stukje tandvlees open gemaakt. Er wordt een gaatje in het kaaksbot geboord, waarna het implantaat wordt geplaatst. Ten slotte wordt het tandvlees gehecht met oplosbare draad.

Na het plaatsen van het implantaat worden er twee controles gepland. Wanneer de ingroeiperiode van het implantaat achter de rug is zal jouw eigen tandarts zorgen voor de vervaardiging en plaatsing van de definitieve kroon (of volledige prothese) op het implantaat.



02

Nazorg

De dokter plaatst de nodige medicatie digitaal op de identiteitskaart die ingenomen kan worden na de ingreep.

De eerste 24 uur is het mogelijk dat de wonde wat kan nabloeden. Om deze bloeding te stoppen kan je even dichtbijten op een washandje of een stoffen zakdoek.

Roken vertraagt de genezing van de wond. Daarom raden wij de eerste 5 dagen een rookstop aan.



Vragen?

Voor meer vragen en informatie over deze ingreep kan je ons altijd contacteren.

secretariaat hoofd-halscentrum
tel.: 011 69 95 22



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   