

Nucleaire geneeskunde



Lymfescintigrafie

Alles wat je moet weten over ...

01

Info

Je werd doorverwezen voor een lymfescintigrafie. In deze folder vind je meer informatie over het onderzoek en de voorbereidingen.

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, stel ze dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Je vindt onze contactgegevens achteraan. We helpen je graag verder.

Team Nucleaire Geneeskunde

02

Wat is een lymfescintigrafie?

Een lymfescintigrafie is een beeldonderzoek dat toelaat het lymfetransport via de lymfevaten in beeld te brengen.

Zowel het fysiologische (= normale) lymfetransport, alsook het transport langs eventuele alternatieve wegen en lymfeklieren kunnen we op die manier bestuderen.

Hiervoor spuiten we een licht radioactieve stof onderhuids in, meestal via de voeten of de handen. Daarna brengen we met een camera het lymfestelsel in beeld.

03 Voorbereiding

Je moet niet nuchter zijn. Je mag dus eten en drinken voor het onderzoek.

Er is geen interferentie met medicatie. Je mag jouw medicatie dus gewoon verder innemen.

Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd bij zwangerschap of borstvoeding. Overleg steeds met jouw arts. Laat ons vooraf weten als je mogelijk zwanger bent of borstvoeding geeft.

Als je steunkousen of een steunverband draagt, vragen we je deze de ochtend van het onderzoek niet aan te doen. Na het onderzoek mag je ze weer dragen.

04 Hoe verloopt het onderzoek?

Net voor het onderzoek

Er wordt een licht radioactieve stof onderhuids ingespoten, meestal via de voeten of de handen.

Het onderzoek

Het onderzoek gebeurt in 2 delen, onderverdeeld in verschillende fasen, en van elkaar gescheiden door 4 uur pauze.

Deel 1

- Fase 1: opname van de lymfeknopen (45 min.).
- Fase 2: korte opname van de lymfeknopen en statische beelden van de inspuitplaatsen (5-10 min.).
- Fase 3: overzicht van het hele lichaam (10 min.).

Deel 2 (na 4 uur)

- Fase 4: statische beelden van de inspuitplaatsen (5-10min.).
- Fase 5: overzicht van heel het lichaam (10 min.).

Na het onderzoek

- Je mag zelf met de wagen naar huis rijden.
- Vermijd langdurig (> 1 uur) en zeer dicht (< 1 m) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (< 12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer (zoals samen televisie kijken met het kind op de schoot).

05 Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan jouw behandelend arts. Hij/Zij bespreekt dit met jou.

06

Bijwerkingen en ongemakken

Het onderzoek duurt in totaal in deel 1, 1 uur en bij deel 2, 10 minuten. Je moet tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil blijven liggen, tenzij de arts of verpleegkundige je vraagt een specifieke oefening uit te voeren.

Voor het uitvoeren van het onderzoek wordt er onderhuids een licht radioactieve stof ingespoten, meestal via de voeten of de handen. Dit kan gevoelig zijn. Er zijn vrijwel geen bijwerkingen. Bij dit onderzoek wordt geen radiologisch contrastmiddel gebruikt.

07

Annulering

Als je onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen, gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Als je tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

nucleaire geneeskunde
tel.: 011 69 93 00



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   